TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
AKTİF MADDELERİNE GÖRE MERKEZCE TEMİN EDİLECEK 1 KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACININ
TESLİM YERİ, TESLİM TARİHİ VE SON KULLANMA TARİHİ

Ek 2

SIRA NO	AKTİF MADDE ADI VE ORANI	KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ADI	TESLİM YERİ GENEL MÜDÜRLÜK	TESLİM YERİ CEYLANPINAR TİM	TESLİM TARİHLERİ	SON KULLANMA TARİHİ (EN AZ)
			İHTİYAÇ MİKTARI (Kg-Lt)	İHTİYAÇ MİKTARI (Kg-Lt)		
1	% 4,5 Mesosulfuron-methyl + %1,5 Thiencarbazone-methyl + % 0,9 Iodosulfuron-methyl- sodium + % 13,5 Mefenpyr-diethyl (Safener) WG	Buğdayda dar ve geniş yapraklı yabancı otlar	8.106,0	13.230,0	11-29 Ocak 2027	2028/MAYIS
	VEYA % 6,95 (% 6,67 ae) Halauxifen-methyl + % 25 Pyroxsulam + % 35,4 Cloquintocet-acid (Safener) WG		2.431,8	3.969,0		
	VEYA 33,30 g/l Pinoxaden + 8,33 g/l Pyroxsulam + 8,33 g/l Cloquintocet mexyl (Safener) EC		40.530,0	66.150,0		
	VEYA %18,75 Pyroxsulam + % 5,21 Halauxifen-methyl + %3,75 Florasulam + % 26,6 cloquintocet-asit (safener) WG		3.242,4	5.292,0		
	VEYA 75 g/l Fluroxypyr- meptyl + 30 g/l Pinoxaden + 1,75 g/l Florasulam + 7,5 g/l Cloquintocet-mexyl (safener) EC		43.232,0	70.560,0		

Serkan MANSUROĞLU
Ziraat Mühendisi

Doğan KOÇ
Şube Müdürü